



Kvalitní osivo pro nejlepší kvalitu objemného krmiva

	čistota osiva	podíl cizorodých semen
GREENSTAR pro trvalé travní porosty	min. 90 – 96 %	max. 1,5 %
GREENSTAR odrůdy leguminóz	min. 97 %	max. 1,5 %

Vynikající vlastnosti použitých odrůd jemnolisté kostřavy rákosovité

Vysoká stravitelnost:

Vyšlechtěné odrůdy jemnolisté kostřavy rákosovité se vyznačují velmi dobrou stravitelností vlákniny. Jemnost listů je rovněž důležitým kritériem kvality.

Nejvyšší výnosy:

Při intenzivnějším využívání porostu se dosahuje až o 25 % vyšších výnosů ve srovnání s ostatními druhy trav. Vybrané odrůdy vykazují velmi vysoký obsah dusíkatých látek.

Suchovzdornost, mrazuvzdornost, snášenlivost vůči zamokření:

Hluboko uložený kořenový systém umožňuje dobře snášet letní sucho i zamokření a poskytuje vysoké výnosy. Odrůdy jsou také velmi odolné vůči zimě.

GREENSTAR STRUKTUR a **GREENSTAR INTENSIV PLUS** obsahují velký podíl jemnolisté kostřavy rákosovité.

To nejlepší z trav


Vysoce kvalitní travní porosty – s bezkonkurenční přidanou hodnotou
Intenzivně obhospodařované travní porosty sehrávají velmi důležitou úlohu při sestavování krmných dávek odpovídajících požadavkům přežvýkavců:

- nákladově příznivá vlastní výroba dusíkatých látek
- vysoce hodnotná strukturální vláknina
- vysoká koncentrace energie v kg sušiny

Více dusíkatých látek a energie z vysoce kvalitního objemného krmiva

Zvýšením intenzity využívání travních porostů významně stoupá výnos dusíkatých látek i energie. Základem pro vysokou frekvenci seči je hnojení, které doplňuje živiny odčerpané z půdy. Dalším důležitým předpokladem je použití vysoce kvalitních travních směsí. Směsi **GREENSTAR** zohledňují svým složením podmínky regionů a vysoce kvalitní krmivo přispívá k dosažení úspěchů v produkci mléka.

Vyšší intenzita využití travních porostů zvyšuje výnos dusíkatých látek a energie



		3 seče	4 seče	5 sečí
výnos	q sušiny/ha	72	90	117
N-látky	% NL/kg suš.	16	17	18
energie	MJ NEL/kg suš.	6,0	6,2	6,3

GREENSTAR-program

	GREENSTAR STRUKTUR	GREENSTAR STRUKTUR III	GREENSTAR STRUKTUR IV	GREENSTAR INTENSIV PLUS	GREENSTAR HORSE FIT	GREENSTAR AF1 TETRA	GREENSTAR TRIPPEL-N	GREENSTAR NACHSAAT		GREENSTAR STRUKTUR PROTA	GREENSTAR ALFA B
	WEST/OST	SÜD									
Doporučení výsevu	nový výsev trvalého travního porostu a ví- celetých pícnin na orné půdě pro intenzivní využití sečením	nový výsev trvalého travního porostu s průměrným využitím sečením	nový výsev trvalého travního porostu s průměrným využitím sečením a spásáním	nový výsev trvalého travního porostu s průměrným využitím sečením a spásáním	nový výsev pastevního porostu pro koně, kozy nebo ovce	nový výsev dvouletých pícnin na orné půdě	zimovzdorná meziplodina pro krmné účely, vhodná také jako greening	přísev trvalého travního porostu		nový výsev trvalého travního porostu a víceletých pícnin na orné půdě	čistý výsev víceletých leguminóz
Popis	výnosově bohatá směs, s obsahem strukturální vlákniny, tolerantní vůči suchu	výnosově bohatá směs, tolerantní vůči suchu	výnosově bohatá směs pícnin, tolerantní vůči suchu	výnosově bohatá směs pícnin, bez jílku	víceletá směs pro intenzivní pastvu koní	dvouletá směs pro intenzivní využití sečením	směs pro výrobu vysoce kvalitní siláže z objemných krmiv a pro aktivní ochranu živin před vymýváním	obnovuje travní drn, zajišťuje výnos a kvalitu krmiva		víceletá výnosově bohatá směs, s vysokým podílem jetelovin	zdravá, výnosově bohatá a vytrvalá odrůda vojtěšky
Podmínky na stanovišti	v létě suchá, v zimě na vymrzání riziková stanoviště	v létě suchá, v zimě na vymrzání riziková stanoviště	v létě suchá, v zimě na vymrzání riziková stanoviště	v létě suchá, v zimě na vymrzání riziková stanoviště	stanoviště s možností dobrého prokořenění	vlhká, živinově bohatá stanoviště, citlivá na chladná stanoviště	stanoviště, která dobře prokořeňují	živinově bohatá stanoviště s dobrým zásobením vodou		v létě suchá, v zimě na vymrzání, riziková stanoviště, stanoviště s možností dobrého prokořenění	půdy vhodné pro hluboké kořenění, nezhutněné a nezamokřené, pH-hodnota půdy > 6,0; min. 4 roky nevyužívané
Vlastnosti	nejvyšší výnos sušiny a N-látek, nejvyšší roční výnosy, nejlepší obrust po posečení, jemnolistá kostřava rákosovitá, odolná vůči suchu a mrazu, vysoká dodávka humusu díky bohatému kořenovému systému, snáší zamokření	dobrá odolnost vůči suchu, vysoké letní výnosy, nejlepší obrust po posečení, jemnolistá kostřava rákosovitá, vysoce stravitelná srha s nejlepší mrazu- vzdorností, jetel plazivý doplňuje protein a podporuje hustotu porostu i pevnost drnu	dobrá odolnost vůči suchu, vysoké letní výnosy, nejlepší obrust po posečení, jemnolistá kostřava rákosovitá, vysoce stravitelná srha s nejlepší mrazuvzdorností	dobrá odolnost vůči suchu, vysoké letní výnosy, nejlepší obrust po posečení, jemnolistá kostřava rákosovitá, vysoce stravitelná srha s nejlepší mrazuvzdorností	nízký obsah fruktanů, druhy trav s nízkým vegetačním vrcholem, snáší nízký okus, velmi dobrá odolnost vůči sešlapání, stabilita drnu	rychle rostoucí směs, tetraploidní odrůdy vytváří hustě zapojený porost, dlouhý vegetativní růst (listová hmota), velmi vysoké výnosy, odrůdy s velmi dobrou odolností vůči zimě a vytrvalostí, nejvyšší stravitelnost	odrůda jílku mnohokvě- tého s vysokou rezistencí vůči hádátkům, nízké nároky na stanoviště, velmi dobrá tolerance vůči suchu, intenzivní a rychlý růst kořenového systému, vysoká schopnost vázat dusík	rychlé uzavření prázdných míst, hustý porost, vysoká chuťnost, vysoká rezistence vůči rzím, vysoká krmná hodnota		nejvyšší výnos sušiny a N-látek, nejvyšší roční výnosy, nejlepší obrust po posečení, jemnolistá kostřava rákosovitá, odolná vůči suchu a mrazu, vysoká dodávka humusu díky bohatému kořenovému systému, vysoká fixace dusíku díky velkému podílu jetelovin	vysoký výnos N-látek, nejlepší rezistence vůči hádátku, nadprůměrná odolnost vůči zimě
Složení	směs z jemnolisté kostřavy rákosovité a tetraploidního jílku vytrvalého s pozdější zralostí	směs z jemnolisté kostřavy rákosovité, srhy laločnaté a jetele plazivého	směs z jemnolisté kostřavy rákosovité, bojínku lučního, srhy laločnaté	směs z jemnolisté kostřavy rákosovité, bojínku lučního, srhy laločnaté, jetele lučního a jetele plazivého	směs z jílku vytrvalého, bojínku lučního, lipnice luční a kostřavy červené	směs z tetraploidních odrůd jílku mnohokvětého	směs z vikve seté, jetele inkarnátu a jílku mnohokvětého	směs z tetraploid- ních a diploidních odrůd jílku vytrvalého se středně pozdním a pozdním stupněm zralosti	směs z tetraploid- ních odrůd jílku vytrvalého s pozdním stupněm zralosti a jetele plazivého	směs z jemnolisté kostřavy rákosovité, jetele lučního a jetele plazivého	odrůda vojtěšky vlámského typu, osivo je naočkováné bakteriemi Rhizobium
Výsevek	50 kg/ha	35 – 45 kg/ha	35 – 45 kg/ha	35 – 45 kg/ha	80 kg/ha	40 – 50 kg/ha	krmivo 50 kg/ha zelené hnojení 30 kg/ha	20 – 25 kg/ha přísev 35 – 40 kg/ha nový výsev		40 – 45 kg/ha	25 – 30 kg/ha
Nejpozdější termín výsevu	1. září	1. září	15. září	15. srpna	15. srpna	15. září	první srpnová dekáda až první zářijová dekáda	15. září		1. září	polovina března až konec dubna; letní výsev do počátku srpna
Dostupnost produktu	sklad CZ	sklad CZ	sklad CZ	sklad CZ	sklad NL	sklad DE	sklad DE	sklad DE		na objednávku	na objednávku